

難防除病害

# サツマイモ基腐病に注意!

九州・沖縄地方を中心に防除が困難なことから発生が拡大しています!

発生地域から感染種イモや苗を持ち込まないようにしましょう!



イモの腐敗



苗基部の黒変



発生初期の状況



地際部の黒変

## ここがポイント

イモの場合：なり首側からの腐敗症状

苗床やほ場の場合：地際の黒～褐色の変色、  
茎葉の変色、しおれ症状等



激発ほ場の状況

**発生を拡大させないためには早期発見が重要です!**

**苗床や、ほ場をよく確認しましょう!**

写真出典：農研機構生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業 (01020C)

令和元年度版マニュアル「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」

[http://www.naro.affrc.go.jp/publicity\\_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134198.html](http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134198.html)

# サツマイモ基腐病

# Q&A



## Q：茨城県での発生は？

A：令和2年12月現在，本県での発生は確認されておられません。  
しかし，感染した種イモや苗の持ち込みにより，発生する恐れがありますので，注意してください。

## Q：どのような病害か？

A：カビ（糸状菌）による病害です。苗床，生育中のほ場，貯蔵中に発生します。感染株から周囲の健全な株に伝染します。  
また，発病残さが土壌に残ると，翌年も発生する恐れがあります。

## Q：防除対策は？

A：他のカビ（糸状菌）による病害と同様に予防が大切です。

①発生地域から種イモや苗を持ち込まないようにします。

（発病ほ場から採取したイモは，見た目が正常でも，病原菌に感染している可能性があります。）

②種イモから採苗する場合は，無病健全な種イモを使用し，苗の消毒を徹底します。

## Q：発病が疑われる株を見つけたら？

A：すぐに株ごと抜き取り，苗床やほ場の外に持ち出しましょう。  
また，下記の間合せ先まで早急にご連絡ください。

## 間合せ先

名 称	連 絡 先	管 轄 地 域
農業総合センター病害虫防除部	TEL 0299-45-8200	-
県北農林事務所 経営・普及部門	TEL 0294-80-3340	日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市
常陸大宮地域農業改良普及センター	TEL 0295-53-0116	常陸大宮市，大子町
県央農林事務所 経営・普及部門	TEL 029-227-1521	水戸市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，東海村
笠間地域農業改良普及センター	TEL 0296-72-0701	笠間市，城里町
鹿行農林事務所 経営・普及部門	TEL 0291-33-6192	鹿嶋市，神栖市，銚田市
行方地域農業改良普及センター	TEL 0299-72-0256	潮来市，行方市
県南農林事務所 経営・普及部門	TEL 029-822-7242	土浦市，石岡市，かすみがうら市
稲敷地域農業改良普及センター	TEL 029-892-2934	龍ヶ崎市，牛久市，稲敷市，美浦村，阿見町，河内町
つくば地域農業改良普及センター	TEL 029-836-1109	取手市，つくば市，守谷市，つくばみらい市，利根町
県西農林事務所 経営・普及部門	TEL 0296-24-9206	筑西市，桜川市，下妻市
結城地域農業改良普及センター	TEL 0296-48-0184	結城市，常総市，八千代町
坂東地域農業改良普及センター	TEL 0297-34-2134	古河市，坂東市，五霞町，境町
農林水産部農業技術課	TEL 029-301-3936	-