

《定期予防接種》

【料金：無料】

R5.4

ワクチン	接種開始年齢	当市の標準的な接種期間	回数	備考	対象年齢	
ヒブ	生後2月から 生後7月に 至るまで	初回	27日（医師が必要と認めた場合には20日）から56日までの間隔をおいて1歳の誕生日の前日までに	3回	初回2回目・3回目の接種は、1歳の誕生日を超えた場合は行わない ↓ この場合、追加接種は可能だが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日（医師が必要と認めた場合には20日）以上の間隔をおいて1回	5歳の誕生日の前日まで
		追加	初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて	1回		
	生後7月に 至った日の 翌日から 1歳の誕生日の 前日まで	初回	27日（医師が必要と認めた場合には20日）から56日までの間隔をおいて1歳の誕生日の前日までに	2回	初回2回目の接種は、1歳の誕生日を超えた場合は行わない ↓ この場合、追加接種は可能だが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日（医師が必要と認めた場合には20日）以上の間隔をおいて1回	
		追加	初回終了後7月から13月までの間隔をおいて	1回		
1歳の誕生日 から 5歳の誕生日の前日まで			1回			
小児用肺炎球菌	生後2月から 生後7月に 至るまで	初回	標準的には1歳の誕生日の前日までに27日以上の間隔をおいて	3回	初回2回目・3回目の接種は、2歳の誕生日を超えた場合は行わない（追加接種は可能） 初回2回目の接種が1歳の誕生日を超えた場合、初回3回目の接種は行わない（追加接種は可能）	5歳の誕生日の前日まで
		追加	生後12月から生後15月に至るまでの間を標準として初回接種終了後60日以上の間隔をおいて	1回		
	生後7月に 至った日の 翌日から 1歳の誕生日の 前日まで	初回	標準的には1歳の誕生日の前日までに27日以上の間隔をおいて	2回	初回2回目の接種は、2歳の誕生日を超えた場合は行わない（追加接種は可能）	
		追加	初回接種終了後60日以上の間隔をおいて	1回		
	1歳の誕生日 から 2歳の誕生日の前日まで			2回	60日以上の間隔をおいて	
	2歳の誕生日 から 5歳の誕生日の前日まで			1回		

ワクチン	当市の標準的な接種期間	回数	対象年齢／備考	
ロタウイルス (令和2年10月1日から)	1価	1回目は生後2月から14週6日後までに 2回目は27日以上の間隔をあけて 出生24週0日後までに完了	2回	【対象：令和2年8月1日以後生まれの方】 1価ワクチン：出生6週0日後から24週0日後まで 5価ワクチン：出生6週0日後から32週0日後まで ※ 原則として1回目と同じワクチンで完了すること
	5価	1回目は生後2月から14週6日後までに 2回目は27日以上の間隔をあけて 出生32週0日後までに完了	3回	
B型肝炎	生後2月から 生後9月に 至るまで	27日以上の間隔をおいて2回 1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目 (20週後の同じ曜日から可能)	3回	1歳の誕生日前日まで (母子感染予防のために、出生後に抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せてB型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方は除く)
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)／ 三種混合・ポリオ	1期 初回接種	生後2月から生後12月に達するまでの間に 20日から56日までの間隔をおいて	3回	生後90月に達するまで (追加接種は初回接種終了後6月以上)
	1期 追加接種	初回接種終了後 12月から18月までの間隔をおいて	1回	
BCG	生後5～8月に達するまで		1回	1歳の誕生日の前日まで
麻しん風しん混合	1期	1歳（できるだけ早い時期に）	1回	2歳の誕生日の前日まで
	2期	小学校就学前1年間（年長児） 【令和5年度】平成29年4月2日～平成30年4月1日生	1回	接種期限 令和6年3月31日まで
水痘	生後12月から 生後15月に達するまでに1回目 1回目接種終了後6月から12月に至るまでの間隔をおいて2回目	2回	3歳の誕生日の前日まで (2回目の接種は3月以上の間隔をおく)	
日本脳炎	1期 初回接種	3歳 6日から28日までの間隔をおいて	2回	生後90月に達するまで (追加接種は初回接種終了後6月以上)
	1期 追加接種	4歳 初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に	1回	

《任意予防接種》

ワクチン	対象者・接種方法	回数	助成内容	備考
おたふくかぜ	1歳以上就学前の3月末日まで	1回 ※	3,000円を上限に1回	

※) 日本小児科学会では、麻しん風しん混合ワクチン2期と同時期に2回目の接種を推奨しています。